

Fungizide in Zuckerrüben



Fungizid	g/l Wirkstoff	l / ha	€/ ha Mittelkosten (ca, +Mwst.)	Wirkung gegen								Anwend. je Jahr	Wartezeit Tage
				Cercospora		Ramularia		Mehltau		Rost			
				heilend	vorbeug.	heilend	vorbeug.	heilend	vorbeug.	heilend	vorbeug.		
Cirkon	90 Propiconazol 400 Prochloraz	1,25	25		++	(+ ++)		+		(+)		2	28
Domark 10EC / Emerald	100 Tetraconazol	1,0	21	+	++	+ +++		+		(+ ++)		2	28
Duett Ultra	310 Thiophanat-methyl 187 Epoxiconazol	0,6	24	+	++++	++ +++++		+ ++		(++ +++++)		2	28
Juwel	125 Epoxiconazol 125 Kresoxim-methyl	1,0	40	+	+++++	(++ +++++)		+ +++++		++ +++++		1	28
Ortiva	250 Azoxystrobin	1,0	35		++++	(++++)		(+)		(+ +++++)		2	35
Retengo Plus *	50 Epoxiconazol 133 Pyraclostrobin	1,0	36	+	++++	++ +++++		+ +++		++ +++++		2	28
Rubric	125 Epoxiconazol	1,0	22	+	++++	++ +++++		+ ++		++ +++++		2	28
Score	250 Difenconazol	0,4	24	+	+++	++ +++		(+)		(+ ++)		2	28
Sphere 535	160 Cyproconazol 375 Trifloxystrobin	0,35	30	+	++++	(++ +++++)		+ +++		++ +++++		1	21
Spyrale	100 Difenconazol 375 Fenpropidin	1,0	34	+	+++	++ +++++		+ +++		(+ ++)		2	28

* zusätzlich Nebenwirkung auf Stemphylium

- + = schwache Wirkung (ca. 5 Tage bei 18°C)
- +++++ = sehr gute Wirkung (ca. 25 Tage bei 18°C)
- () = Wirkung ohne Zulassung

Stand 2017-05-03

Quellen: ARGE Nord, proPlant, PSD NRW

© LIZ