




Produkt	Hersteller / Vertrieb	Wirkstoffe / Gehalte	Zielorganismus	Anwendungszeit	Einsatzbedingungen	max. Anwendungen				Wartezeit	Zulassung bis Ende Aufbrauchfrist bis	Auflagen, Anwendungsbestimmungen				Abstand zum ... (in m)					
						Anzahl	Aufwand je Anwend.		Wassermenge			Tage	Jahr	Bienen	Grundw.	Gewässer	Saumbiotop	Oberflächengewässer			
							l,kg/ha	l,kg/ha										l/ha	Risikokategorie	Regel	90%
Figaro	Monsanto Agrar Deutschland GmbH	360 Glyphosat	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VS	Nach der Ernte oder vor dem Wiedergreenen	1	5,0	5,0	100 bis 400	F	2014	B4	NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>		
				VS	bis 2 Tage vor der Saat; bis 5 Tage nach der Saat	1	3,0	3,0								0	0	0	0		
			NA	Spätverunkrautung, Abstand von 28 Tagen, Streichverfahren	2	33%-ige Lösung		60	0	0	0	0									
Glyfos	Stähler Deutschland GmbH & Co. KG	360 Glyphosat	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VS, VA	bis 2 Tage vor der Saat; bis 5 Tage nach der Saat	1	3,00	3,00	200 bis 400	F	2016	B4	NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>		
			NA	Herbst nach der Ernte ODER nach dem Wiedergreenen	1	5,00	5,00	0								0	0	0			
Glyfos Dakar	Cheminova A/S	680 Glyphosat	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Gemeine Quecke, Ausfallkulturen	VA	bis 2 Tage vor der Saat, bis 5 Tage nach der Saat	1	1,60	1,60	200 bis 400	F	2020	B4	NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>		
				NA	Herbst nach der Ernte ODER nach dem Wiedergreenen	1	2,65	2,65								0	0	20 <sup>2)</sup>	20 <sup>2)</sup>		
Glyfos Premium	Stähler Deutschland GmbH & Co. KG	450 Glyphosat	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VS, VA	bis 2 Tage vor der Saat; bis 5 Tage nach der Saat	1	2,40	2,40	200 bis 400	F	2019	B4	NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>		
			NA	Herbst nach der Ernte ODER nach dem Wiedergreenen	1	4,00	4,00	0								0	20 <sup>2)</sup>	20 <sup>2)</sup>			
Glyfos SUPREME	Stähler Deutschland GmbH & Co. KG	450 Glyphosat	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VS, VA	bis 2 Tage vor der Saat; bis 5 Tage nach der Saat	1	2,40	2,40	200 bis 400	F	2019	B4	NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>		
			NA	Herbst nach der Ernte ODER nach dem Wiedergreenen	1	4,00	4,00	0								0	20 <sup>2)</sup>	20 <sup>2)</sup>			
Glyphogan	Feinchemie Schwebda GmbH	360 Glyphosat	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VS	Herbst nach der Ernte ODER nach dem Wiedergreenen	1	5,00	5,00	100 bis 400	F	2014	B4	NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>		
				VS	bis 2 Tage vor der Saat	1	3,0	3,0								0	0	0	0		
NA	Spätverunkrautung, Abstand von 28 Tagen, Streichverfahren	2	33%-ige Lösung		60	0	0	0	0												
HYGANEX-flüssig	Bayer CropScience Deutschland GmbH	183 Glufosinat	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VS	WP 734	1	5,0	5,0	300 bis 400	F	2015	B4	NG 412	NW 642	NT 109	Länderabstand	5 <sup>2)</sup>	25 <sup>2)</sup>	25 <sup>2)</sup>	25 <sup>2)</sup>	
Herburan GL	Spieess-Urania Chemicals GmbH	360 Glyphosat	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VS	bis 2 Tage vor der Saat, WW 742	1	3,0	3,0	200 bis 300	F	2012	B4	NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>		
Keeper Unkrautfrei	Bayer CropScience Deutschland GmbH	360 Glyphosat	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VS, VA	bis 2 Tage vor der Saat; bis 5 Tage nach der Saat	1	3,00	3,00	200 bis 400	F	2016	B4	NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>		
			NA	Herbst nach der Ernte ODER nach dem Wiedergreenen	1	5,00	5,00	0								0	0	0			
Klick&Go Roundup LB Plus	Monsanto Agrar Deutschland GmbH	360 Glyphosat	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VS	nach der Ernte ODER nach dem Wiedergreenen; WW 742	1	5,0	5,0	100 bis 400	F	2016	B4	NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>		
			NA	Spätverunkrautung, Abstand von 28 Tagen, Streichverfahren, Einzelpflanzenbehandlung	2	33%-ige Lösung		60	0	0						0					
Klick&Go Total-Unkrautfrei	Monsanto Agrar Deutschland GmbH	360 Glyphosat	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VS	nach der Ernte ODER nach dem Wiedergreenen; WW 742	1	5,0	5,0	100 bis 400	F	2016	B4	NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>		
			NA	Spätverunkrautung, Abstand von 28 Tagen, Streichverfahren, Einzelpflanzenbehandlung	2	33%-ige Lösung		60	0	0						0					
Nufosate	Nulfarm GmbH & Co KG	360 Glyphosat	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VS	bis 2 Tage vor der Saat	1	3,0	3,0	100 bis 400	F	2014	B4	NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>		
			NA	Spätverunkrautung, Abstand von 28 Tagen, Streichverfahren	2	33%-ige Lösung		60	0	0						0					
Plantaclean 360	Plantan GmbH	360 Glyphosat	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VS	nach der Ernte ODER nach dem Wiedergreenen; WW 742	1	5,0	5,0	100-400	F	2014	B4	NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>		
				VS	bis 2 Tage vor der Saat	1	3,0	3,0	0	0						0	0				
			NA	Schosserrüben, Ackerkratzdistel	2	33%-ige Lösung (max. 3 l/ha)		60	0	0	0	0									
Plantaclean Label XL	Plantan GmbH	360 Glyphosat	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Ausfallkulturen, Ausfallgetreide Kartoffeldurchwuchs	VS	Im Herbst nach der Ernte	1	5,0	5,0	100 bis 400	F	30.06.2012	B4	NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>		
			Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VS	Nach der Ernte oder vor dem Wiedergreenen	1	5,00	5,00	200	F	2014	B4	NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>		
				VS	bis 2 Tage vor der Saat; WW 742	1	3,0	3,0	200 bis 400	60						0	0	0			
NA	Spätverunkrautung, Abstand von 28 Tagen, Streichverfahren, max. 3l/ha	2	33%-ige Lösung		60	0	0	0	0												
Profi 360	Monsanto Agrar Deutschland GmbH	360 Glyphosat	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VS	Nach der Ernte oder vor dem Wiedergreenen	1	5,00	5,00	200	F	2014	B4	NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>		
			VS	bis 2 Tage vor der Saat; WW 742	1	3,0	3,0	200 bis 400	60	0						0	0				
NA	Spätverunkrautung, Abstand von 28 Tagen, Streichverfahren, max. 3l/ha	2	33%-ige Lösung		60	0	0	0	0												
Profi Glyphosat	Nulfarm GmbH & Co KG	360 Glyphosat	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VS	bis 2 Tage vor der Saat	1	3,0	3,0	100 bis 400	F	2014	B4	NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>		
			NA	Spätverunkrautung, Abstand von 28 Tagen, Streichverfahren	2	33%-ige Lösung		60	0	0						0					
Purgarol	Spieess-Urania Chemicals GmbH	360 Glyphosat	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VS	Nach der Ernte oder vor dem Wiedergreenen	1	5,00	5,00	200	F	2012	B4	NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>		
				VS	bis 2 Tage vor der Saat; WW 742	1	3,0	3,0	200 bis 400	60						0	0	0			
			NA	Spätverunkrautung, Abstand von 28 Tagen, Streichverfahren	2	33%-ige Lösung		60	0	0	0	0									
RA-200-flüssig	Bayer CropScience Deutschland GmbH	183 Glufosinat	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VS	WP 734	1	5,0	5,0	300 bis 400	F	2015	B4	NG 412	NW 642	NT 109	Länderabstand	5 <sup>2)</sup>	25 <sup>2)</sup>	25 <sup>2)</sup>	25 <sup>2)</sup>	
Roundup LB Plus	Monsanto Agrar Deutschland GmbH	360 Glyphosat	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VS	Nach der Ernte oder vor dem Wiedergreenen	1	5,0	5,0	100 bis 400	F	2016	B4	NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>		
			NA	Spätverunkrautung, Abstand von 28 Tagen, Streichverfahren	2	33%-ige Lösung		10,0	0	0	0										
Roundup Roto	Monsanto Agrar Deutschland GmbH	360 Glyphosat	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Ausfallkulturen	VS	Nach der Ernte oder vor dem Wiedergreenen	1	5,0	5,0	100 bis 400	F	2016	B4	NW 642	NT 101	Länderabstand	0	0	0	20 <sup>2)</sup>		
			NA	Spätverunkrautung, Abstand 28 Tage	2	33%-ige Lösung		10,0	0	0	0										

# Totalherbizide mit Zulassung in Ackerbaukulturen Stand 13.07.2011

	Hersteller / Vertrieb	Wirkstoffe / Gehalte	Zielorganismus	Anwendungszeit Einsatzbedingungen	max. Anwendungen				Wartezeit	Zulassung bis Ende Aufbrauch-frist bis	Auflagen, Anwendungs-bestimmungen				Abstand zum ... (in m)							
					↓	Aufwand		Wasser-menge			Tage	Jahr	Bienen	Grundw.	Gewässer	Saumbiotop	Oberflächengewässer				terrestr. Saumbiotop	
						je Anwend.	je Veget.										Risikokategorie	Regel		Abdriftminderungs-klasse		
Produkt	q/l bzw. q/kg				Anzahl	l/kg/ha	l/kg/ha	l/ha						B	C	D	Regel	90%	75%	50%	0%	
<b>Roundup TURBO</b>	Monsanto Agrar Deutschland GmbH	680 Glyphosat	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VS nach der Ernte ODER nach dem Wiederergrünen	1	2,65	2,65	100 bis 400	F	2012	B4	NW 642	NT 101	Länderabstand				0	0	0	20 <sup>2)</sup>	
				VS bis 2 Tage vor der Saat; WW 742	1	1,6	1,6															
				VA bis 5 Tage nach der Saat; WW 742	1	1,6	1,6															
<b>Roundup Ultra</b>	Monsanto Agrar Deutschland GmbH	360 Glyphosat	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter Schosserrüben, Ackerkratzdistel	VS Nach der Ernte oder vor dem Wiederergrünen	1	5,0	5,0	100 bis 400	F	2016	B4	NW 642	NT 101	Länderabstand				0	0	0	20 <sup>2)</sup>	
				NA Streichverfahren (Abstand 28 Tage)	2	33%-ige Lösung	10,0															
<b>Roundup UltraMax</b>	Monsanto Agrar Deutschland GmbH	450 Glyphosat	Einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VA bis 5 Tage nach der Saat und nach der Ernte oder nach dem Wiederergrünen	1	4,0	4,0	100 bis 400	F	2014	B4	NW 642	NT 101	Länderabstand				0	0	0	20 <sup>2)</sup>	
<b>Roundup TURBOplus</b>	Monsanto Agrar Deutschland GmbH	680 Glyphosat	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter, Ausfallkulturen, Gemeine Quecke	VS nach der Ernte ODER nach dem Wiederergrünen, Herbst	1	2,65	2,65	200 bis 400	F	2020	B4	NW 642	NT 102	Länderabstand				0	0	0	20 <sup>2)</sup>	
				VS bis 2 Tage vor der Saat	1	1,6	1,6															
				VA bis 5 Tage nach der Saat	1	1,6	1,6						NT 101									
<b>Stakkato GA</b>	Bayer CropScience Deutschland GmbH	360 Glyphosat	Ein- und zweikeimblättrige Unkräuter	VS bis 2 Tage vor der Saat; WW 742	1	3,0	3,0	200 bis 300	F	2012	B4	NW 642	NT 101	Länderabstand				0	0	0	20 <sup>2)</sup>	
<b>Taifun forte</b>	Feinchemie Schwebda GmbH	360 Glyphosat	Einkeimblättrige, zweikeimblättrige Unkräuter	VS bis 2 Tage vor der Saat; WW 742	1	5,0	5,0	150 bis 400	F	2016	B4	NW 642	NT 102	Länderabstand				0	0	20 <sup>2)</sup>	20 <sup>2)</sup>	
<b>TOUCHDOWN QUATTRO</b>	Syngenta Agro GmbH	360 Glyphosat	Einkeimblättrige, zweikeimblättrige Unkräuter	VS bis 2 Tage vor der Saat; WW 742	1	3,0	3,0	200 bis 300	F	2012	B4	NW 642	NT 101	Länderabstand				0	0	0	20 <sup>2)</sup>	
				VS bis 2 Tage vor der Saat; WW 742	1	3,0	3,0															
<b>WEEDKILL</b>	HWR-Chemie GmbH	360 Glyphosat	Einkeimblättrige, zweikeimblättrige Unkräuter	VA bis 5 Tage nach der Saat; WW 742	1	3,0	3,0	200 bis 400	F	2016	B4	NW 642	NT 101	Länderabstand				0	0	0	20 <sup>2)</sup>	
				VS nach der Ernte ODER nach dem Wiederergrünen; WW 742	1	5,0	5,0															

<sup>2)</sup> in Gebieten mit ausreichend Kleinstrukturen ist kein Abstand zu Saumbiotopen einzuhalten

Grundsätzlich gelten die Hinweise auf der Verpackung!

- NG 412** 5 m Abstand bei > 2% Hangneigung außer bei Mulch-Direktsaat oder Auffangsystemen
- NW 642** Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist nicht zulässig (§ 6 Absatz 2 PflSchG). Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
- WP 734** Schäden an der Kulturpflanze möglich
- WW 742** Das Mittel besitzt keine nachhaltige Wirkung gegen ausdauernde Unkräuter.