

# Insektizid-Strategie 2023



WIRKSTOFF-  
WECHSEL

Tefluthrin-Beize

## Frühbefall mit Blattläusen

> 10 % bef. Pfl. (*Myzus persicae*)  
> 30 % bef. Pfl. (*Aphis fabae*)

**ggfs.: 300 g / ha Pirimor G\***  
**max. Anwendung: 1**

Wichtig: Feldkontrolle 5 Tage nach Behandlung

## Befall mit Rübenfliege

10 – 30 % bef. Pfl. mit Larven  
in BBCH 12-16

**Pyrethroide**

## Neubefall mit Blattläusen

> 10 % / 30 % bef. Pfl.

**ggfs.: 0,25 l / ha Carnadine\***,  
**max. Anwendung: 2**

**ggfs.: 250 g / ha  
Danjiri\*, Mospilan\***  
**max. Anwendung: 1**

**140 g / ha Teppeki,**  
**max. Anwendung: 1**

## Spätbefall mit Blattläusen

> 10 % / 50 % bef. Pfl.

**ggfs.: Pirimor G\*, Carnadine\*,  
Danjiri\*, Mospilan\*, Teppeki**

## Befall mit Gammaeule/ Rübsenblattwespe

> 20 % Blattschaden

**Pyrethroide**

