



Insektizide	Insektizide solo	Bienengefährdung durch Mischungen mit Fungiziden																
		ALCEDO	AMISTAR GOLD	Cirkon	DOMARK 10 EC	Duett Ultra	Emerald	Eminent	Juwel	MAVITA 250 EC	Mercury	Mercury Pro	Ortiva	Quadris	Retengo Plus	Rubric	SCORE	Sphere
Pyrethroide																		
Bulldock	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾
CLAYTON SPARTA	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾
CYCLONE	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾
Decis forte	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾
Fastac ME	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
Hunter	B4	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B4	B4	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾
JAGUAR	B4	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B4	B4	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾
Kaiso Sorbie	B4	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B4	B4	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾
Karate Zeon	B4	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B4	B4	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾
KUSTI	B4	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B4	B4	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾
Lamdex forte / Lambda WG	B4	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B4	B4	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾
Life Scientific Lambda-Cyhalothrin	B4	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B4	B4	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾	B2 ²⁾
Shock Down	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾
Carboxamide																		
Teppeki	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾	B2 ¹⁾
Phosphorsäurester																		
BI 58 Insektenvernichter	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
Danadim Progress	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
Rogor 40 LC	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
Carbamate																		
PIRIMAX	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4
Pirimor-Granulat	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4

Stand: 31.07.2019

- 1) Pyrethroide mit B2-Auflage (NB 6621) dürfen solo und in Mischungen mit jeglichen Fungiziden nur abends nach dem täglichen Bienenflug und dann auch nur bis spätestens 23:00 Uhr eingesetzt werden.
- 2) Hat ein Mittel wie derzeit alle Pyrethroide mit B4-Auflage die Auflage **NB 6623**, so darf es in Mischungen mit Ergosterolbiosynthesehemmern an blühenden und von Bienen beflogenen Pflanzen nur abends nach dem täglichen Bienenflug und dann auch nur bis spätestens 23:00 Uhr eingesetzt werden (B2).

Bienengefährdung

- B1 / bienengefährlich
- B2 / bienengefährlich, außer bei Anwendung nach dem Ende des täglichen Bienenfluges in dem zu behandelnden Bestand bis 23:00 Uhr
- B3 / aufgrund der durch die Zulassung festgelegten Anwendung des Mittels werden Bienen nicht gefährdet
- B4 / nicht bienengefährlich