Herbizide mit Zulassung in Rüben

Stand: 26.07.2021

Produkt	Hersteller/Vertrieb	Wirkstoffe/Gehalte	Zielorganismus	Anwendungszeit BBCH-Stadium			WP 734	WP 738	WP 775	Anwendung		Aufwandmenge		Wartezeit	Zulassung bis Ende Aufbrauchfrist bis	HRAC-Gruppe	Gewässer						Saumstruktur		
					ZR	UK				Abstand/Bemerkungen	max. Anwendungen	je Anwend.	je Veget.				Auflagen, Anwendungs-bestimmungen	Hanglage >2% mit m geschlossene Pflanzendecke außer bei Mulch- oder Direktsaat	bei Abtriftminderung Abstand (m) LA=Länderabstand				Auflagen, Anwend-ungsbe-stimmungen	keine Behandl. auf m	Abdrift-minderung (%) auf 20 m Breite
																			90%	75%	50%	0%			
		g/l bzw. g/kg									Anzahl	l,kg/ha	l,kg/ha	Tage	Jahr										
Aabetan Tandem	Cheminova Deutschland GmbH	200 Ethofumesat + 200 Phenmedipham	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	NA			x		x	Splittingverfahren; Abstand 5-14 Tage	3	1,0 / 1,5 / 1,5	5,0	90	**2022**	N	NG405 NW607-1		10	20	kein Einsatz				0%
AGIL-S	ADAMA Deutschland GmbH	100 Propaquizafop	Einjährige Einkeimblättrige Unkräuter **außer:** einjährige Rispe und Gemeine Quecke	NA	ab 2.LB					Beh.zeitpunkt: bis 14Tage nach BBCH39	1	1,00	1,0	F	**30.11.2022**	A	NW642-1		LA						0%
BARILOCHE	PROPLAN - Plant Protection Company S.L.	100 Clopyralid	Echte Kamille, Geruchlose Kamille, Gemeines Kreuzkraut	NA	ab 2.LB		x				1	1,20	1,2	42	**30.04.2021**	O	NW642-1		LA				NT101		50% 2)
			Acker-Kratzdistel, Acker-Gänsedistel																						
Beetix SC	UPL Europe Ltd.	696 Metamitron	Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	VA/NA NA			x			Splittingverfahren; Abstand 6-14 Tage 1.Beh. VA 2.+3.Beh. NA	3	2,0 / 2,0 / 2,0	6,0	F	**31.08.2023**	C1	NG402 NW642	10	LA						0%
Beetix WG	UPL-Deutschland GmbH	700 Metamitron	Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	VA/NA/NA						6 bis 14 Tage	3	3,0 / 1,0 / 1,0	5,0	F	**31.08.2023**	C1	NG404 NW642-1	20	LA				NT103		90% 2)
				NA	ab KB							1,0 / 2,0 / 2,0													
Belvedere Duo	ADAMA Deutschland GmbH	200 Phenmedipham + 200 Ethofumesat	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	NA	ab 2 LB	ab KB	x		x	Splittingverfahren; Abstand 5 bis 9 Tage	2	2,00	4,0	90	**31.07.2021**	C1 + N	NW605 NW606 NW701	10	LA		5	5	NT103		90% 2)
	ADAMA Deutschland GmbH		Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	NA	ab 2 LB	ab KB	x		x	Splittinverfahren; 2. Beh. nach 4-5 Tage, 3. Beh. nach 6-10 Tage	3	1,3 / 1,3 / 1,3	5,0	90			NW609 NW705	5	LA			5			
Betanal Tandem	Bayer CropScience Deutschland GmbH	200 Phenmedipham + 190 Ethofumesat	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	NA	ab KB	ab KB bis 2. LB	x			5 bis 14 Tage; Splittingverfahren mit 1,0 l MERO	3	1,0 / 1,5 / 1,5	4,0	F	**31.07.2022**	C1 + N	NG405 NW706 NW609-1	20	LA			5	NT101		50% 2)
Betasana SC	UPL-Deutschland GmbH	160 Phenmedipham	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	NA	ab 4. LB	ab KB					1	6,0	6,0	90	**31.07.2023**	C1	NW604 NW607		10	20	kein Einsatz				0%
					ab KB					Splittingverfahren; 6 bis 15 Tage	2	3,0							5	10	20	kein Einsatz			
											3	2,0							5	10	15	Einsatz			
Betosip SC	UPL Europe Ltd.	160 Phenmedipham	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	NA	ab 4. Lbl.						1	6,0	6,0	90	**31.07.2023**	C1	NW604 NW607		10	20	kein Einsatz				0%
					ab KB					Splittingverfahren; 6 bis 15 Tage	2	3,0							5	10	20	kein Einsatz			
											3	2,0							5	10	15	Einsatz			
Centurion	Arysta Life Science S.A.S.	240 Clethodim	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter	NA	ab 2. LB	ab 2. LB				in Mischung mit RADIAMIX 1 l/ha	1	0,75	0,75	F	**2024**	A	NW642-1		L A				NT108	5	75% 2)
			Gemeine Quecke			bis 20 cm						1,0	1,0										NT109	5	90% 2)
CLAP	Sharda Cropchem Espana S.L.	300 Clopyralid	Acker-Kratzdistel, Kamille-Arten	NA	ab 2.LB		x				1	0,4	0,4	F	**2036**	O	NW642-1		LA				NT102		75% 2)
CLIOPHAR 600 SL	Arysta Life Science Germany GmbH	600 Clopyralid	Acker-Hundskamille, Kamille-Arten	NA			x				1	0,2	0,2	F	**2036**	O	NW642-1		LA				NT102		75% 2)
			Acker-Kratzdistel	NA							1	0,2	0,2												
Completto	ADAMA Deutschland GmbH	65 Phenmedipham + 65 Ethofumesat + 280 Metamitron	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	NA	ab 2. LB				X	7 bis 14 Tage; Splittingvervahren	3	3,0 / 4,0 / 4,0	11,0	90	**30.06.2021**	C1 + N	NW701 NW609	10	LA		5		NT103		90% 2)
DARIUM	Zenith CropSciences Bulgaria LTD	50 Quizalofop-P	Einkeimblättrige Unkräuter **außer:** einjähriges Rispengras	NA	ab 3LB						1	1,25	1,25	110	**30.11.2022**	A	NW642-1		LA				NT102		75% 2)
			Gemeine Quecke, (Niederhaltung zwecks Führung der Kultur)			Beh. bei 15-20 cm					1	2,5	2,5										NT103		90% 2)
DEBUT	DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH	486 Triflusulfuron + Formulierungshilfstoff	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	NA	ab 1LB		X			7 bis 14 Tage, vorgeschriebene Mischung mit TREND 0,25 l/ha	3	30 g/ha + 0,25 l/ha Trend	90 g/ha + 0,75 l/ha TREND	F	**2022**	B	NW609-1		LA		5				0%
DEBUT DuoActive	Cheminova Deutschland GmbH	69 Triflusulfuron + 714 Lenacil	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	NA	ab KB		X			Splittingverfahren; vorgreschriebene Mischung mit TREND 0,25 l/ha	2	0,21	0,42	F	**2021**	B	NG405 NW605-1 NW606 NW706	20	LA		5	5	NT102		75% 2)
											3	0,21	0,63												
			zurückgezogener Amarant, Purpurrote Taubnessel, Acker-Senf, Acker-Hellerkraut							Splittingverfahren; 5 bis 14 Tage	3	0,21	0,63						LA		5	5	NT101		50% 2)
Devoid	JT Agro Ltd, Cropthetics Ltd.	700 Metamitron	Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter; **außer:** Klettenlabkraut, Knöterichar ten	VA/NA/ NA	von Samen bis 9.LB					7 bis 14 Tage, Splittingverfahren	3	2 / 1,5 / 1,5	5	F	**31.08.2023**	C1	NG404 NW642-1	20	LA				NT103		90% 2)
			Knöterich - Arten	NA	ab KB						3	1,65	4,95												
DIGATOR	HELM AG	108 Quizalofop-P	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter	NA	ab KB	ab 2LB					1	0,6	0,6	87	**30.11.2022**	A	NW642-1		LA				NT101		50% 2)
			Gemeine Quecke			15-20 cm					1	1,0	1,0										NT102		75% 2)
Dinagam	Nufarm Deutschland GmbH	46,3 Quizalofop-P	Einkeimblättrige Unkräuter **außer:** einjähriges Rispengras	NA	ab 2LB						1	1,25	1,25	60	**30.11.2022**	A	NW642-1		LA				NT101		50% 2)
			Gemeine Quecke, (Niederhaltung zwecks Führung der Kultur)	NA		15-20 cm					1	2,0	2,0										NT102		75% 2)
ELEMENT 05 EC	Sharda Cropchem Espana S.L.	50 Quizalofop-P	Gemeine Quecke, (Niederhaltung zwecks Führung der Kultur)	NA	ab 1. LB						1	3,0	3,0	F	**30.11.2022**	A	NW642-1		LA				NT102		75% 2)
Focus Ultra	BASF SE	100 Cycloxydim	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter **außer:** einjähriges Rispengras	NA	ab 1. LB						1	2,5	2,5	56	**2025**	A	NW642-1		LA				NT101		50% 2)
			Gemeine Quecke	NA		15-20 cm					1	5,0	5,0										NT102		75% 2)

Herbizide mit Zulassung in Rüben

Stand: 26.07.2021

Produkt	Hersteller/Vertrieb	Wirkstoffe/Gehalte	Zielorganismus	Anwendungszeit BBCH-Stadium			WP 734	WP 738	WP 775	Anwendung		Aufwandmenge		Wartezeit	Zulassung bis Ende Aufbrauchfrist bis	HRAC-Gruppe	Gewässer						Saumstruktur		
					ZR	UK				Abstand/Bemerkungen	max. Anwendungen	je Anwend.	je Veget.				Auflagen, Anwendungs-bestimmungen	Hanglage >2% mit m geschlossene Pflanzendecke außer bei Mulch- oder Direktsaat	bei Abtriftminderung Abstand (m) LA=Länderabstand				Auflagen, Anwend-ungsbe-stimmungen	keine Behandl. auf m	Abdrift-minderung (%) auf 20 m Breite
																			90%	75%	50%	0%			
		g/l bzw. g/kg									Anzahl	l,kg/ha	l,kg/ha	Tage	Jahr										
Flua Power	Nufarm Deutschland GmbH	128,05 Fluazifop-p-butyl	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide	NA	ab 1. LB						1	0,8	0,8	56	**2023**	A	NW642-1		LA				NT103		90% 2)
			Gemeine Quecke, Straußgras-Arten								1	2,5	2,5				NW609-1		LA	LA	1	kA	NT109	5	90% 2)
Fusilade Max	Syngenta Agro GmbH	107 Fluazifop-p-butyl	Einkeimblättrige Unkräuter **außer:** einjähriges Rispengras	NA		ab 2. LB					1	1,0	1,0	90	**2022**	A	NW642-1		LA				NT101		50% 2)
			Gemeine Quecke	NA		2. LB bis 4. LB					1	2,0	2,0										NT103		90% 2)
GALLANT SUPER	Dow AgroSciences GmbH, AGRPHAR S.A.	104,0 Haloxyfop	Einkeimblättrige Unkräuter **außer:** einjähriges Rispengras	NA							1	0,5	0,5	90	30.06.2022	A	NG345-3 NW642-1		LA						0%
Glotron 700 SC	Platan GmbH	700 Metamitron	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, **außer:** Klettenlabkraut, Knöterich-Arten	NA	KB bis 8. LB	bis 2. LB oder Bl.quirl entfaltet				mindestens 5 Tage; Splittingverfahren	3	1,5 / 1,5 / 2,0	5,0	F	**31.08.2023**	C1	NG403 NG404 NW642-1	20	LA						0%
										mindestens 5 Tage; Splittingverfahren	3	1,0 / 2,0 / 2,0	5,0												
Goltix Gold	ADAMA Deutschland GmbH	700 Metamitron	Einjähriges Rispengras, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, **außer:** Klettenlabkraut, Knöterich-Arten	VA / NA/ NA	bis 8. LB	bis 2. LB				7 bis 14 Tage; Splittingverfahren; eine VA + zwei NA;	3	2,0 / 1,5 / 1,5	5,0	F	**31.08.2023**	C1	NG404 NW642	20	LA						0%
				NA	ab KB					7 bis 14 Tage; Splittingverfahren	3	1,0/2,0/2,0 bzw. 1,5 / 1,5 / 2,0	5,0												
Goltix Super	ADAMA Deutschland GmbH	350 Metamitron + 150 Ethofumesat	Einjähriges Rispengras, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	NA	ab KB	KB bis 4. LB	X		X	7 bis 12 Tage; Splittingverfahren	3	2,0	6,0	F	**2024**	C1 + N	NG402 NW642-1	10	LA				NT102		75% 2)
GOLTIX TITAN	ADAMA Deutschland GmbH	525 Metamitron + 40 Quinmerac	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	VA / NA						2. bis 4. Beh. Im Abstand 5 bis 10 Tage	4	1 x 3,0 VA / 3 x 1,0 NA	6,0	F	**31.08.2023**	C1 + O	NG343 NG404 NW642-1	20	LA						0%
				NA	ab KB					5 bis 10 Tage; Splittingverfahren	3	2,0													
GRAMFIX	Bayer CropScience Deutschland GmbH	46,3 Quizalofop-P	Einkeimblättrige Unkräuter **außer:** einjähriges Rispengras	NA	ab KB	ab 2.LB					1	1,25	1,25	60	**30.11.2022**	A	NW642-1		LA				NT101		50% 2)
			Gemeine Quecke			15-20cm					1	2,0	2,0										NT102		75% 2)
GRAMIN	Lotus Agrar GmbH	46,3 Quizalofop-P	Einkeimblättrige Unkräuter **außer:** einjähriges Rispengras	NA	ab KB	ab 2.LB					1	1,25	1,25	60	**30.11.2022**	A	NW642-1		LA				NT101		50% 2)
			Gemeine Quecke			15-20 cm					1	2,0	2,0										NT102		75% 2)
Grasser 100 EC	HELM AG/ Belchim Crop Protection	108 Quizalofop-P	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter	NA	ab KB	ab 2.LB					1	0,6	0,6	87	**30.11.2022**	A	NW642-1		LA				NT101		50% 2)
			Gemeine Quecke			15-20 cm					1	1,0	1,0										NT102		75% 2)
KASKAD	Life Scientific Limeted	486 Trisulfuron	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	NA	KB		X			Splittingverfahren; Abstand 7 bis 14 Tage	3	0,03	0,09	F	**2021**	B	NW609-1		LA			5			0%
Kezuro	BASF SE	571 Metamitron + 71 Quinmerac	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	VA							1	3,5	3,50	F	**30.04.2022**	C1 + O	NG343 NG404 NW642-1	20	LA				NT103		90%3)
				NA	ab KB					Splittingverfahren; Abstand mind. 7 Tage	3	0,9 / 1,3 / 1,3	3,5				NG343						NT102		75%2)
Leopard	Syngenta Agro GmbH	50,0 Quizalofop-P	Einkeimblättrige Unkräuter **außer:** einjähriges Rispengras	NA	ab 2. LB						1	1,25	1,25	100	**30.11.2022**	A	NW642-1		LA				NT103		90% 2)
			Gemeine Quecke	NA							1	2,50	2,50												
LONTREL 600	Dow AgroSciences GmbH	600 Clopyralid	Acker-Hundskamille, Kamille-Arten,	NA			X				1	0,2	0,2	F	**2036**	O	NW642-1		LA				NT102		75% 2)
			Acker-Kratzdistel			15-25 cm																			
LONTREL 720 SG	Dow AgroSciences GmbH	720 Clopyralid	Acker-Hundskamille, Kamille-Arten,	NA							1	167 g/ha	167 g/ha	90	**2036**	O	NW642-1		LA				NT102		75% 2)
			Acker-Kratzdistel			15-25cm																			
Maceta 50	Zenith Crop Sciences Bulgaria LTD	50,0 Quizalofop-P	Einkeimblättrige Unkräuter	NA	ab 2 LB						1	2,50	2,50	60	**30.11.2022**	A	NW642-1		LA				NT103		90% 2)
Metafol SC	UPL-Deutschland GmbH	696 Metamitron	Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter; **außer:** Klettenlabkraut, Knötericharten	VA / NA/ NA	bis 9LB		X			Splittingverfahren; 6 bis 14 Tagen	3	2,0	6,0	F	**31.08.2023**	C1	NG402 NW642	10	LA						0%
Metafol Super	UPL-Deutschland GmbH	350 Metamitron + 150 Ethofumesat	Einjähriges Rispengras, einjährige zweikeimblättrige Unkräuter **außer:** Kamille-Arten	VA / NA/ NA	bis 9LB		X		X	5 Tage; Splittingverfahren	3	2,0	6,0	F	**31.08.2023**	C1 + N	NG404 NW609-1; NW800	20	LA			5	NT102		75% 2)
Metatron	CERTIPLANT N.V.	700 Metamitron	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	VA / NA / NA						Splittingverfahren; Abstand mind. 14 Tagen	3	1,0 / 2,0 / 2,0	5,0	F	**31.08.2023**	C1	NG404 NW642-1	20	LA				NT103		90% 2)
Mitron 700 SC	CERTIPLANT N.V.	700 Metamitron	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter; **außer**: Kletten-Labkraut, Knöterich-Arten	VA/ NA / NA	bis Be-stands schluß					Splittingverfahren; Abstand mind. 14 Tagen	3	1,0 / 2,0 / 2,0	5,0	F	**31.08.2023**	C1	NG404 NW642-1	20	LA				NT103		90% 2)
MONEO	Zenith Crop Sciences Bulgaria LTD	50,0 Quizalofop-P	Einkeimblättrige Unkräuter **außer:** einjähriges Rispengras	NA	ab 3.LB						1	1,25	1,25	110	**30.11.2022**	A	NW642-1		LA				NT102		75% 2)
			Gemeine Quecke	NA							1	2,50	2,50										NT103		90% 2)
MTM700	Synergy Generics / TerreChem Limited	700 Metamitron	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter; **außer**: Kletten-Labkraut, Knöterich-Arten	VA / NA / NA						7-14 Tage; Splittingverfahren	3	1,65 / 1,65 / 1,65	5,0	F	**31.08.2023**	C1	NG404 NW642-1	20	LA				NT103		90% 2)
												2,0 / 1,5 / 1,5	5,0	F											
MURENA 500	Steffes GmbH	500 Ethofumesat	Klettenlabkraut, Vogelsternmiere	NA	ab KB	ab 1. LB		X	X	7 bis 10 Tage; Splittingverfahren	3	0,67	2,0	F	**31.10.2021**	N	NG403 NG402 NW642	10	LA				NT102		75% 2)
Nervure	Nissan Chemical	50 Quizalofop-P	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter **außer:** einjähriges Rispengras	NA	ab KB	ab 2. LB					1	1,25	1,25	110	**30.11.2022**	A	NW642-1		LA				NT101		50% 2)
			Gemeine Quecke, (Niederhaltung zwecks Führung der Kultur)	NA							1	2,5	2,5										NT102		75% 2)

Herbizide mit Zulassung in Rüben

Stand: 26.07.2021

Produkt	Hersteller/Vertrieb	Wirkstoffe/Gehalte	Zielorganismus	Anwendungszeit BBCH-Stadium			WP 734	WP 738	WP 775	Anwendung		Aufwandmenge		Wartezeit	Zulassung bis Ende Aufbrauchfrist bis	HRAC-Gruppe	Gewässer						Saumstruktur		
					ZR	UK				Abstand/Bemerkungen	max. Anwendungen	je Anwend.	je Veget.				Auflagen, Anwendungs-bestimmungen		Hanglage >2% mit m geschlossene Pflanzendecke außer bei Mulch- oder Direktsaat	bei Abtriftminderung Abstand (m) LA=Länderabstand				Auflagen, Anwend-ungsbe-stimmungen	keine Behandl. auf m	Abdrift-minderung (%) auf 20 m Breite
																				90%	75%	50%	0%			
		g/l bzw. g/kg									Anzahl	l,kg/ha	l,kg/ha	Tage	Jahr											
Nymeo	Bayer CropScience Deutschland GmbH	696 Metamitron	Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter; ausgenommen: Kletten, Knöterich	VA/NA/ NA	bis 9LB	bis 5. Seiten-spross	x			6 bis 14 Tage; Splittingverfahren	3	2,0 / 2,0 / 2,0	6,0	F	**31.08.2023**	C1	NG402	NW642	**10**	**LA**						**0%**
Oblix	UPL-Deutschland GmbH	500 Ethofumesat	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	NA	ab 2.LB		x			Splittingverfahren; Abstand mind. 5 Tagen	3	0,60	1,8	F	**31.10.2032**	N	NG403 NG404	NW642-1	**20**	**LA**				NT101		**50%** [2)]
					ab 4.LB						1	1,00	1,0													
Oblix 500	UPL-Deutschland GmbH	500 Ethofumesat	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	NA	ab 4 LB	2.LB.-6.LBl.	x		x		1	1,00	1,0	F	**31.10.2032**	N		NW642-1		**LA**				NT101		**50%** [2)]
					ab 2 LB	2.LB-6.LB				10 bis 14 Tage; Splittingverfahren	2	0,60	1,2													
Panarex	Arysta Life Science Germany GmbH	32,06 Quizalofop-P	Einkeimblättrige Unkräuter **außer:** einjähriges Rispengras	NA							1	1,25	1,25	60	**30.11.2022**	A		NW642		**LA**				NT102		**75%** [2)]
			Gemeine Quecke	NA							1	2,25	2,25											NT103		**90%** [2)]
Pantera	Arysta Life Science / UPL Deutschland GmbH	32,06 Quizalofop-P	Einkeimblättrige Unkräuter **außer:** einjähriges Rispengras	NA							1	1,25	1,25	60	**30.11.2022**	A		NW642		**LA**				NT102		**75%** [2)]
			Gemeine Quecke	NA							1	2,25	2,25											NT103		**90%** [2)]
PHANTOM	Sharda Cropchem Espana S.L.	106,742 Fluazifop-P	Ausfallgetreide; Einjährige einkeimblättrige Unkräuter **außer:** einjähriges Rispengras	NA	ab KB	2. LB - 1.Bestock ungs-trieb					1	1,00	1,0	56	**2024**	A		NW642-1		**LA**				NT102		**75%** [2)]
			Gemeine Quecke	NA							1	2,00	2,0											NT103		**90%** [2)]
PROMETEUS	JT Agro Ltd. / Cropthetics Ltd.	700 Metamitron	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter; **außer**: Kletten-Labkraut, Knöterich-Arten	VA/ NA / NA						14 Tage; Splittingverfahren	3	1,65 / 1,65 / 1,65	5,0	F	**31.08.2023**	C1	NG404	NW642-1	**20**	**LA**				NT103		**90%** [2)]
												2,0 / 1,5 / 1,5														
				NA	ab KB							1,65 / 1,65 / 1,65														
			Knöterich-Arten	NA	ab KB							1,65 / 1,65 / 1,65														
Rango	Arysta Life Science Germany GmbH	31,81 Quizalofop-P	Einkeimblättrige Unkräuter **außer:** einjähriges Rispengras	NA							1	1,25	1,25	60	**30.11.2022**	A		NW642		**LA**				NT102		**75%** [2)]
			Gemeine Quecke, (Niederhaltung zwecks Führung der Kultur)	NA							1	2,25	2,25											NT103		**90%** [2)]
RUTRON	Nufarm Deutschland GmbH	700 Metamitron	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	VA / NA / NA						Splittingverfahren; 7-14 Tage	3	1,65 / 1,65 / 1,65		F	**31.08.2023**	C1	NG404	NW642-1	**20**	**LA**				NT103		**90%** [2)]
												2,0 / 1,5 / 1,5														
				NA								1,65 / 1,65 / 1,65														
SELECT 240 EC	Arysta Life Science Germany GmbH	240 Clethodim	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter	NA	ab 2LB	ab 2.LB				vorgeschriebene Mischung mit Radiamix	1	0,75 (Mischung mit Radiamix 1,0 l/ha)	0,75 + 1,0	F	**2024**	A		NW642-1		**5**[1)]	**10**[1)]	**15**[1)]	**30**[1)]	NT108	**5**	**75%** [2)]
			Gemeine Quecke bis 15-20 cm Wuchshöhe	NA		15-20cm					1	1,0 (Mischung mit Radiamix 1,0 l/ha)	1,0 + 1,0											NT109	**5**	**90%** [2)]
SHIRO	UPL-Deutschland GmbH	485,915 Trisulfuron	Geruchlose Kamille, Kletten-Labkrau	NA	ab KB		X			Splittingverfahren; Abstand von 7 bis 14 Tagen	4	0,03	0,120	F	**2021**	B		NW605-1 NW606		**LA**	**5**	**5**	**10**			**0%**
Shiro 500	UPL-Deutschland GmbH	485,8 Trisulfuron	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	NA	ab 1.Lbl.	1.LB	X			Splittingverfahren; Abstand von 7 bis 14 Tagen in Mischung mit TREND (Splitting: 0,25 l/ha)	3	0,03 + 0,25 l/ha Trend	0,09 + 0,75 l/ha Trend	F	**2021**	B		NW609-1		**LA**			**5**			**0%**
Spectrum	BASF SE	720 Dimethenamid-P	Zweikeimblättrige Unkräuter	NA	6 LB bis 8 LB						1	0,9	0,9	F	**30.04.2022**	K3		NW605 NW606		**5**	**5**	**10**	**15**	NT101		**50%** [2)]
STEMAT	Stefes GmbH	500 Ethofumesat	Klettenlabkraut, Vogelsternmiere	NA	ab KB	KB bis 2. LB		X	X	7 bis 10 Tage; Splittingverfahren	3	0,66	2,0	F	**31.10.2021**	N	NG402 NG403	NW642	**10**	**LA**				NT102		**75%** [2)]
SYNERGY GENERICS METAMITRON	Synergy Generics	700 Metamitron	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter; **außer**: Kletten-Labkraut, Knöterich-Arten	VA/ NA/ NA						7-14 Tage; Splittingverfahren	3	1,65 / 1,65 / 1,65	5,0	F	**31.08.2023**	C1	NG404	NW642-1	**20**	**LA**				NT103		**90%** [2)]
												2,0 / 1,5 / 1,5														
				NA								1,65 / 1,65 / 1,65														
Tanaris	BASF SE	333 Dimethenamid-P + 167 Quinmerac	Hühnerhirse, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	NA			X			Splittingverfahren; Abstand von 7 Tage Zeitpunkt 1 (BBCH 10 - 12) Zeitpunkt 2 (BBCH 13 - 14) Zeitpunkt 3 (BBCH 15 - 18)	3	0,3 / 0,6 / 0,6	1,5	F	**31.10.2021**	K3 + O		NW609-1		**LA**			**5**			**0%**
TARGA Max	Nissan Chemical	92,5 Quizalofop-P	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, **außer:** einjähriges Rispengras	NA	ab KB	ab 2. LB					1	0,60	0,6	F	**30.11.2022**	A		NW642-1		**LA**				NT101		**50%** [2)]
			Gemeine Quecke (Niederhaltung zwecks Führung der Kultur)	NA	ab KB						1	1,25	1,25											NT102		**75%** [2)]
TARGA SUPER	Nissan Chemical Dow AgroSciences GmbH Nufarm Deutschland GmbH	46,3 Quizalofop-P	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, **außer:** einjähriges Rispengras	NA	ab KB	ab 2. LB					1	1,25	1,25	F	**30.11.2022**	A		NW642-1		**LA**				NT101		**50%** [2)]
			Gemeine Quecke (Niederhaltung zwecks Führung der Kultur)	NA	ab KB	15-20 cm					1	2,0	2,0											NT102		**75%** [2)]

Herbizide mit Zulassung in Rüben

Stand: 26.07.2021

Produkt	Hersteller/Vertrieb	Wirkstoffe/Gehalte	Zielorganismus	Anwendungszeit BBCH-Stadium			WP734	WP738	WP775	Anwendung		Aufwandmenge		Wartezeit	Zulassung bis Ende Aufbrauchfrist bis	HRAC-Gruppe	Gewässer						Saumstruktur		
										Abstand/Bemerkungen	max. Anwendungen	je Anwend.	je Veget.				Auflagen, Anwendungs-bestimmungen	Hanglage >2% mit m geschlossene Pflanzendecke außer bei Mulch- oder Direktsaat	bei Abtriftminderung Abstand (m) LA=Länderabstand				Auflagen, Anwend-ungsbe-stimmungen	keine Behandl. auf m	Abdrift-minderung (%) auf 20 m Breite
					ZR	UK																			
		g/l bzw. g/kg									Anzahl	l,kg/ha	l,kg/ha	Tage	Jahr				90%	75%	50%	0%			
Target SC	UPL-Deutschland GmbH	700 Metamitron	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter; **außer**: Kletten-Labkraut, Knöterich-Arten	NA	ab KB					5 Tage; Splittingverfahren	8	0,5 -1,0	5,0	F	**31.08.2023**	C1	NG403; NG404 NW642-1	20	LA						0%
			Echte Kamille	VA							1	3,00	3,0												
Tramat 500	Bayer CropScience Deutschland GmbH	500 Ethofumesat	Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere	NA	ab KB			X	X	Splittingverfahren; Abstand 7 bis 10 Tage	3	0,66	2,0	F	**31.10.2032**	N	NG402 NG403 NW642-1	10	LA				NT103		90% 2)
Trepach	Zenith Crop Sciences Bulgaria LTD	50,0 Quizalofop-P	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, **außer:** einjähriges Rispengras	NA	ab 3.LB						1	1,25	1,25	F	**30.11.2022**	A	NW642-1		LA				NT102		75% 2)
			Gemeine Quecke (Niederhaltung zwecks Führung der Kultur)	NA	ab 3.LB						1	2,5	2,5										NT103		90% 2)
TRIVKO	Syngenta Agro GmbH	107 Fluazifop-P	Ausfallgetreide; Einkeimblättrige Unkräuter **außer:** einjähriges Rispengras	NA		ab 2. LB					1	1,00	1,0	90	**2022**	A	NW642-1		LA				NT101		50% 2)
			Gemeine Quecke	NA		ab 2. LB					1	2,00	2,0										NT103		90% 2)
V-Dim 240 EC	Vextachem s.r.l.	240 Clethodim	Einjährige einkeimblättrige Unkeäuter **außer**: Weidelgras-Arten, Ackerfuchsschwanz, Einjähriges Rispengras	NA	ab 1.LB						1	0,75	0,75	F	**31.05.2022**	A	NW642-1		LA				NT108	5	75% 2)
V-Tron 700 SC	Vextachem s.r.l.	700 Metamitron	Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter; **außer:** Klettenlabkraut, Knöterich-Arten	VA/NA/NA						Splittingverfahren; Abstand 7-14 Tage	3	2,0 + 1,5 + 1,5	5,0	F	**31.08.2023**	C1	NG404 NW642-1	20	LA				NT103		90% 2)
				NA	1.LB						3	1,0 + 2,0 + 2,0													
											3	1,5 + 1,5 + 2,0													
Venzar 500SC	Cheminova Deutschland GmbH	500 Lenacil	Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter	NA	ab KB	1.LB	X				1	1,00	1,0	F	**2022**	C1	NG360 NW605-1 NW606 NW706	20	5	5	10	20			0%
										Splittingverfahren; Abstand 5 bis 8 Tage	2	0,50	1,0				NG360 NW605-1 NW606 NW706 NW800		5	5	10	15			
											3	0,33	1,0						5	5	10	15			
											4	0,25	1,0						LA	5	5	15			
VextaDIM 240 EC	Vextachem s.r.l.	240 Clethodim	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter; **außer:** Weidelgras-Arten, Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras	NA	ab 1.LB						1	0,75	0,75	F	**31.05.2022**	A	NW642-1		LA				NT108	5	75% 2)
Vex-Tron	Vextachem s.r.l.	700 Metamitron	Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter; **außer**: Kletten-Labkraut, Knöterich-Arten	NA	ab 1.LB					7-14 Tage; Splittingverfahren	3	1,5 / 1,5 / 2,0	5,0	F	**31.08.2023**	C1	NG404 NW642-1	20	LA				NT103		90% 2)
				VA / NA / NA								1,0 / 2,0 / 2,0													
												2,0 / 1,5 / 1,5													
VextaMitron 700 SC	Vextachem s.r.l.	700 Metamitron	Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter; **außer**: Kletten-Labkraut, Knöterich-Arten	NA	ab LB					7-14 Tage; Splittingverfahren	3	1,5 / 1,5 / 2,0	5,0	F	**31.08.2023**	C1	NG404 NW642-1	20	LA				NT103		90% 2)
				VA/ NA/ NA								1,0 / 2,0 / 2,0													
												2,0 / 1,5 / 1,5													
Vivendi 100	AgriChem B.V. United Phosphorus GmbH	100 Clopyralid	Ackerkratzdistel	NA	ab KB	15-25 cm					2	1,2	2,4	90	**2036**	O	NW642-1		LA				NT101		50% 2)
			Acker-Hundskamille; Kamille-Arten	NA	ab KB	ab Auflauf																			
ZETROLA	ADAMA Deutschland GmbH Syngenta Agro GmbH	100 Propaquizafop	Einjährige einkeimblättrige Unkräuter ausgenommen: Einjähriges Rispengras, Gemeine Quecke	NA	2 LB					Beh.: bis 14 Tage nach Erreichen von BBCH 39	1	1,0	1,0	F	**30.11.2022**	A	NW642-1		LA						0%

Grundsätzlich gelten die Hinweise auf der Verpackung!

[1]	Bei Risikokategorie: B=5, C=10, D=15, Regel=30
[2]	in Gebieten mit ausreichend Kleinstrukturen ist der Einsatz verlustmindernder Technik nicht erforderlich
F	Unter Beachtung der Anwendungsbedingungen ist keine Wartezeit einzuhalten. Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z.B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.
NB6641 (für alle Herbizide)	Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
NG301	Keine Anwendung in Wasserschutzgebieten oder Einzugsgebieten von Trinkwassergewinnungsanlagen, die vom BVL im Bundesanzeiger veröffentlicht wurden (Bekanntmachung BVL 15/02/01 vom 12.02.2015, BAnzAT 27.02.2015 B6; auch veröffentlicht unter www.bvl.bund.de/NG301).
NG343	Die maximale Aufwandmenge von 250 g Quinmerac pro Hektar und Jahr auf derselben Fläche darf - auch in Kombination mit anderen diesen Wirkstoff enthaltenden Pflanzenschutzmitteln - nicht überschritten werden.
NG345	Auf derselben Fläche im folgenden Kalenderjahr keine Anwendung von Mitteln mit dem Wirkstoff Haloxyfop-P (Haloxyfop-R).
NG345-3	In einem Dreijahreszeitraum (der das aktuelle Jahr und die vorausgegangenen 2 Kalenderjahre umfasst) darf in der Summe eine Gesamtaufwandmenge von 0,052 kg Haloxyfop-P (Haloxyfop-R) pro Hektar nicht überschritten werden.
NG402	Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 10 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn: - ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder - die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.
NG403	Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 1. November und dem 15. März.
NG404	Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn: - ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden bzw. mit der Kanalisation verbunden sind, oder - die Anwendung im Mulch - oder Direktsaatverfahren erfolgt.
NG405	Keine Anwendung auf drainierten Flächen.
NG415	Keine Anwendung auf folgenden Bodenarten gemäß Bodenkundlicher Kartieranleitung (5. Aufl.): reiner Sand (Ss), schwach schluffiger Sand (Su2), schwach lehmiger Sand (Sl2), schwach toniger Sand (St2), mittel schluffiger Sand (Su3), mittel lehmiger Sand (Sl3), stark schluffiger Sand (Su4), stark lehmiger Sand (Sl4) und schluffig-lehmiger Sand (Slu). Sofern kein Gutachten nach Bodenkundlicher Kartieranleitung (5. Aufl.) vorliegt,gilt das Anwendungsverbot für alle Böden der Bodenartgruppen 0 bis 3 gem. LUFA-Klassifizierung mit den Bezeichnungen flachgründiger Sand (S), Sand (S), lehmiger Sand (IS), sandiger Schluff (sU), stark sandiger Lehm (ssl) und lehmiger Schluff (IU).
NT101	Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 50 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist der Einsatz verlustmindernder Technik nicht erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im "Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile" vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist.
NT102	Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 75 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist der Einsatz verlustmindernder Technik nicht erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im "Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile" vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist.
NT103	Die Anwendung des Mittels muss in einer Breite von mindestens 20 m zu angrenzenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist der Einsatz verlustmindernder Technik nicht erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind oder die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im "Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile" vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist.
NT108	Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehalten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauf folgenden Breite von mindestens 20 m mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 75 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist weder der Einsatz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind. Bei der Anwendung des Mittels ist ferner die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht erforderlich, wenn die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im "Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile" vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind.
NT109	Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flächen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege und Plätze) eingehalten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauf folgenden Breite von mindestens 20 m mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 90 % eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist weder der Einsatz verlustmindernder Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m erforderlich, wenn die Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind. Bei der Anwendung des Mittels ist ferner die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht erforderlich, wenn die Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im "Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile" vom 7. Februar 2002 (Bundesanzeiger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist oder angrenzende Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind.
NW604	Die Anwendungsbestimmung, mit der ein Abstand zum Schutz von Oberflächengewässern festgesetzt wurde, gilt nicht in den durch die zuständige Behörde besonders ausgewiesenen Gebieten, soweit die zuständige Behörde dort die Anwendung genehmigt hat.
NW605	Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in dasVerzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit "*" gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, § 6 Absatz 2 Satz 2 PflSchG zu beachten.
NW606	Ein Verzicht auf den Einsatz verlustmindernder Technik ist nur möglich, wenn bei der Anwendung des Mittels mindestens unten genannter Abstand zu Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich
NW607	Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit "*" gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, § 6 Absatz 2 Satz 2 PflSchG zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
NW607-1	Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mit einem Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Dabei sind, in Abhängigkeit von den unten aufgeführten Abdriftminderungsklassen der verwendeten Geräte, die im Folgenden genannten Abstände zu Oberflächengewässern einzuhalten. Für die mit "*" gekennzeichneten Abdriftminderungsklassen ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
NW609	Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mindestens mit unten genanntem Abstand erfolgen. Dieser Abstand muss nicht eingehalten werden, wenn die Anwendung mit einem Gerät erfolgt, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Unabhängig davon ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, § 6 Absatz 2 Satz 2 PflSchG zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro geahndet werden.
NW609-1	Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasserführender Oberflächengewässer - muss mindestens mit unten genanntem Abstand erfolgen. Dieser Abstand muss nicht eingehalten werden, wenn die Anwendung mit einem Gerät erfolgt, das in das Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Unabhängig davon ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindestabstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro geahndet werden.
NW642	Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist nicht zulässig (§ 6 Absatz 2 PflSchG). Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
NW642-1	Die Anwendung des Mittels in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern oder Küstengewässern ist nicht zulässig. Unabhängig davon ist der gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebene Mindestabstand zu Oberflächengewässern einzuhalten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis zu einer Höhe von 50.000 Euro geahndet werden.
NW701	Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 10 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn: - ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder - die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.
NW705	Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 5 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn:- ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder- die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.
NW706	Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächengewässern - ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich periodisch wasserführender - muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeitsgeräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 20 m haben. Dieser Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn:- ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, bzw. mit der Kanalisation verbunden sind oder- die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.
NW800	Keine Anwendung auf gedrainten Flächen zwischen dem 01. November und dem 15. März.
WP734	Schäden an der Kulturpflanze möglich
WP738	Blattdeformationen möglich
WP775	Unter ungünstigen Witterungsbedingungen sind Schäden an Folgekulturen, insbesondere Wintergetreide, möglich.
WW742	Das Mittel besitzt keine nachhaltige Wirkung gegen ausdauernde Unkräuter.

© LIZ