

# Saatgutbehandlung Zuckerrüben

	Force Magna	Sombrero <sup>1)</sup>	Cruiser + Force	Poncho Beta + <sup>2)</sup>
<b>Fungizide</b>		<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 5px;">                     14 g/U Hymexazol (Tachigaren)                      6-10 g/U Thiram (Aatiram)                 </div>		
<b>Insektizide</b>	15 g/U Thiamethoxam 6 g/U Tefluthrin	60 g/U Imidacloprid	60 g/U Thiamethoxam 8 g/U Tefluthrin	60 g/U Clothianidin 30 g/U Imidacloprid 8 g/U Beta-Cyfluthrin
Wirksamkeit gegen ...				
<b>Moosknopfkäfer (Wurzel)</b>	++	++(+)	++(+)	+++
<b>Moosknopfkäfer (Blatt)</b>	+(+)	++(+)	++	+++
<b>Drahtwurm</b>	++(+)	++	++(+)	++(+)
<b>Tausendfüßler</b>	++(+)	++(+)	+++	+++
<b>Collembolen</b>	++(+)	+++	+++	++(+)
<b>Blattläuse</b>	+(+)	+++	+++	+++
<b>Blattläuse Langzeitwirkung</b>	+	+++	+++	+++
<b>Rübenfliege</b>	++	++	+++	+++
<b>bodenbürtige Pilze</b> (Pythium, Aphanomyces)	+++	+++	+++	+++
<b>samenbürtige Pilze</b> (Pythium, Alternaria, Fusarium, Phoma)	+++	+++	+++	+++

U = 100.000 Pillen

Neonicotinoide = lange anhaltende systemische Wirkung

Pyrethroide = Kontakt- u. Atemgift, auch gegen größere Bodenschädlinge

Fungizide = Kontaktwirkung

+ = schwache Wirkung

++ = gute Wirkung

+++ = sehr gute Wirkung

Stand 08.2017

© LIZ

<sup>1)</sup> Aussaat auf drainierten Flächen erst ab 16.3. zulässig

<sup>2)</sup> keine Aussaat auf drainierten Flächen