

Sortenleistung SV-N 2016-2018
Nematoden tolerante/resistente Sorten
mit Nematoden-Befall

Sorten	Vertrieb	Prüf-jahre	relativer Ertrag und relative Qualität (mit Fungizid) ^a									Blattkrankheiten					
			RE	ZG	ZE	AmN	SMV	BZE	BZE-Konstanz			BZE-Verlust ^b		Anfälligkeit 1-9		FA Schosser	
									2016	2017	2018	%	Toleranz	Cerc.	Mehl.	rel.	Anz./ha
Thaddea KWS ^{c,1t}	KWS	2WP NT+1	109,8	95,4	104,8	92,2	98,7	104,4	105,0	104,0	104,1	keine unterschiedlichen Fungizidbehandlungen durchgeführt	3,6	1,4		7	
Lunella KWS ^{c,1t}	KWS	2WP NT+1	106,0	98,6	104,5	100,9	100,4	104,4	105,5	104,9	102,6		3,3	1,7		89	
Feliciana KWS ^{b,1t}	KWS	1 WP NT+1	109,3	95,0	103,8	99,8	103,7	102,9	102,4	103,5	102,8		3,0	1,4	98,7	6	
BTS 7300 N ^{c,1t}	BTS	2WP NT+1	103,2	99,7	103,0	83,5	92,5	103,5	104,9	102,5	103,3		3,3	1,5		5	
Annarosa KWS ^{b,1t}	KWS	1 WP NT+2	102,0	100,7	102,9	99,1	98,4	103,1	104,3	103,5	101,6		2,8	1,5	101,4	115	
Daphna ^{1t}	HIL	3	107,0	95,3	102,0	117,1	106,2	100,9	100,5	101,0	101,3		3,4	1,9	98,7	86	
Lisanna KWS ^{1t}	KWS	3	101,1	100,6	101,9	93,6	96,9	102,2	103,0	102,7	100,9		3,1	1,4	100,1	31	
BTS 5270 N ^{b,1t}	BTS	1 WP NT+2	101,3	100,6	101,9	103,0	102,0	101,9	103,6	102,0	100,0		3,4	1,9	93,8	0	
BTS 8750 N ^{1t}	BTS	3	100,9	99,5	100,5	102,5	105,1	100,1	102,3	99,6	98,4		2,7	1,3	98,6	34	
BTS 440 ^{1t}	BTS	3	98,8	101,2	100,2	93,8	97,9	100,5	100,2	99,9	101,3		2,7	1,3	99,7	4	
Evamaria KWS ^{b,1t}	KWS	1 WP NT+2	96,8	102,9	99,8	106,9	101,6	100,0	102,0	101,3	96,6		3,4	1,8	99,6	66	
Fiorella KWS ^{1t}	KWS	3	101,5	97,5	98,9	112,2	105,7	98,2	100,9	98,4	95,4		3,0	1,5	100,6	23	
Brix ^{1t}	STR	3	96,9	99,9	97,0	110,5	101,6	96,9	97,5	97,1	96,2		3,4	2,6	101,4	28	
Aluco ^{b,1t}	SES	1 WP NT+2	93,4	103,1	96,5	107,1	99,0	96,9	96,3	98,6	95,9		3,5	2,1	102,2	3	
Kleist ^{1t}	STR	3	97,1	99,1	96,5	106,4	100,2	96,4	98,0	96,7	94,5		3,3	2,5	101,4	19	
Finola KWS ^{1t}	KWS	3	93,2	102,8	96,0	95,5	99,0	96,4	96,3	96,4	96,6		2,7	1,3	101,5	0	
Rhinema ^{b,1t,3}	HIL	1 WP NT+2	86,9	101,0	87,8	129,3	112,4	87,2	85,9	89,9	85,8	2,3	1,8	95,6	19		
Racoon ^{b,d,1t}	SES	14,17,18	97,0	101,4	98,5	122,6	104,2	98,4				3,2	2,7	102,1	3		

Quelle: IFZ verändert

a 100 = Verrechnungsmittel der Sorten Finola KWS, Lisanna KWS, BTS 440, Daphna
b Felddaufgang zweijährige Daten

c Felddaufgang nur einjährige Daten (daher keine Ausweisung)

d 2014, 2017, 2018 (diskontinuierliche Auswertung aufgrund eines Sonderfalls in der Zulassung beim Bundessortenamt. Ergebnisse der Sorte Racoon sind nicht direkt mit den anderen Sorten vergleichbar).

Toleranz/Resistenz (neben Rizomania)
^{1t} = Heterodera tolerant

^{1r} = Heterodera resistent

² = Ditylenchus tolerant

³ = Rhizoctonia resistent